



## Bruksanvisning

# Rektallösning/rektalgel i flaska

### Före användning

Läs igenom hela bruksanvisningen.

Rektallösningen/rektalgelen administreras med hjälp av en spruta (injektionsspruta) med rektalspets. Rektalspets måste beställas separat (Rectal Lead, 25 st, varunummer 845039).

### Vid användning

1. Tryck kolven ända in i sprutan. Sätt sprutan i flaskan och dra försiktigt ut kolven, så att vätskan sugts in i sprutan. Dra upp ordinerad volym och överfyll med 0,3 ml.
2. Tryck ordentligt fast en rektalspets på sprutan. Smörj gärna spetsen med vaselin eller liknande.
3. Patienten bör ligga på magen, alternativt i sidoläge med knäna upp-dragna mot hakan. Behandling av små barn underlättas genom att hålla barnet i knäet. För in hela rektalspetsen i ändtarmen, hos spädbarn bara till ca 2/3 av rektalspetsens längd.
4. Tryck kolven ända in i sprutan. Efter insprutning dras spetsen försiktigt ut med kolven fortfarande intryckt. En viss mängd vätska (0,3 ml) kommer att finnas kvar i spetsen. Ligg kvar och håll skinkorna sammanpressande under ett par minuter så att vätskan inte rinner ut.
5. Sprutan och rektalspetsen är avsedd för engångsbruk och kasseras efter användning.

