

Bruksanvisning

Rektallösning/rektalgel i flaska

Före användning

Läs igenom hela bruksanvisningen.

Rektallösningen/rektalgelen administreras med hjälp av en spruta (injektionsspruta) med rektalspets. Rektalspets måste beställas separat (Rektalspets Luer, 10 x 25 st, varunummer 330720).

Vid användning

1. Tryck kolven ända in i sprutan. Sätt sprutan i flaskan och dra försiktigt ut kolven, så att vätskan suggs in i sprutan. Dra upp ordinerad volym och överfyll med 0,3 ml.
2. Tryck **ordentligt** fast en rektalspets på sprutan. Smörj gärna spetsen med vaselin eller liknande.
3. Patienten bör ligga på magen, alternativt i sidoläge med knäna uppdragna mot hakan. Behandling av små barn underlättas genom att hålla barnet i knäet. För in hela rektalspetsen i ändtarmen, hos spädbarn bara till ca 2/3 av rektalspetsens längd.
4. Tryck kolven ända in i sprutan. Efter insprutning dras spetsen försiktigt ut med kolven fortfarande intryckt. En viss mängd vätska (0,3 ml) kommer att finnas kvar i spetsen. Ligg kvar och håll skinkorna sammanpressande under ett par minuter så att vätskan inte rinner ut.
5. Sprutan och rektalspetsen är avsedd för engångsbruk och kasseras efter användning.

